

令和7年度 人参耕作者カード

*裏面へ続く

※使用農薬については、普及所、営農指導員の指導を受け別紙登録薬剤一覧又は令和7年富良野地区営農推進協議会の病害虫防除手引を参考にして下さい。

北千生氣株式会社
TEL 0167-44-2255 FAX 0167-44-2436

薬剤名	倍率・使用時期・回数	1回目		2回目		3回目		4回目	
		月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率
<殺虫剤>									
タイジノ粒剤5	6kg・播種前・1回								
ネトリシース粒剤	15~20kg・播種前・1回								
バゲートL粒剤	20~50kg・播種前・1回								
ビーム粒剤	20kg・播種前・1回								
マラソン乳剤	2000~3000倍・14日前・4回								
ランネット45DF	1000倍・前日・2回								
ゲットアウトWDG	3000倍・7日前・2回								
ペイオフME液剤	2000倍・14日前・1回								
アクロスリン乳剤	2000倍・7日前・2回								
フローバックDF	1000倍・前日								
フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍・前日・2回								
カスケード乳剤	4000倍・3日前・2回								
モスピランSL液剤	4000倍・前日・3回								
ベネビ70D	2000~4000倍・前日・3回								
ティアナSC	2500~5000倍・前日・2回								
<除草剤>									
ゴーゴーサン乳剤	200~400ml・播種直後・1回								
ゴーゴーサン細粒剤F	4~5kg・播種直後・1回								
カイタック乳剤	300~500ml・播種直後・1回								
セレクト乳剤	50~75ml・40日前・1回								
ナブ乳剤	150~200ml・14日前・1回								
ロップス水和剤	100~200g・播種直後1回								
"	100~150g・3~5葉期迄・1回								
ワンクロスWG	200~250g・30日前・1回								
ホルトフロアブル	200~300ml・45日前・1回								
トレファノサイト乳剤	200~300ml・播種直後・1回								

備考欄