

# 令和7年度 馬鈴薯耕作者カード

|                    |                     |         |     |     |        |       |          |    |
|--------------------|---------------------|---------|-----|-----|--------|-------|----------|----|
| 生産者氏名              |                     |         | TEL |     |        | 生産者番号 |          |    |
| 住 所                |                     |         |     |     |        | 収穫日   | 月 日      |    |
| 面 積                | a                   | 前作名     |     | 品 種 |        |       | 令和8年希望面積 | a  |
| 肥料 (基肥・10a・kg)     |                     | 土改剤・有機質 |     |     | 葉面剤布・他 |       |          |    |
|                    |                     |         |     |     |        |       |          |    |
| 北千生氣株式会社 安心・安全栽培履歴 |                     |         |     |     |        |       |          |    |
| 薬 剤 名              | 倍率・使用時期・回数          |         | 1回目 |     | 2回目    |       | 3回目      |    |
|                    |                     |         | 月/日 | 倍率  | 月/日    | 倍率    | 月/日      | 倍率 |
| <殺菌剤>              |                     |         |     |     |        |       |          |    |
| オカル顆粒水和剤           | 250g/10a全面散布・植付前・1回 |         |     |     |        |       |          |    |
| グローバル顆粒水和剤         | 750~1000倍・7日前・5回    |         |     |     |        |       |          |    |
| ホライントライフルアブル       | 1000~2500倍・14日前・4回  |         |     |     |        |       |          |    |
| リライアブルフルロアブル       | 800~1000倍・7日前・3回    |         |     |     |        |       |          |    |
| グリーンベニコゼンブル水和剤     | 400~600倍・7日前・10回    |         |     |     |        |       |          |    |
| ソーベンクエンカンティア       | 2000倍・14日前・3回       |         |     |     |        |       |          |    |
| コサイト3000           | 1000倍               |         |     |     |        |       |          |    |
| スターナ水和剤            | 1000倍・7日前・5回        |         |     |     |        |       |          |    |
| ランマンフルアブル          | 1000~2000倍・7日前・4回   |         |     |     |        |       |          |    |
| カスミンボルトード          | 500~800倍・7日前・3回     |         |     |     |        |       |          |    |
| アグリマイシン-100        | 1000~1600倍・3日前・5回   |         |     |     |        |       |          |    |
| <殺虫剤>              |                     |         |     |     |        |       |          |    |
| モスピランSL液剤          | 2000~6000倍・7日前・3回   |         |     |     |        |       |          |    |
| オルトラン水和剤           | 1000~1500倍・30日前・2回  |         |     |     |        |       |          |    |
| ゲットアウトWDG          | 2000~3000倍・7日前・4回   |         |     |     |        |       |          |    |
| ウラDF               | 2000~4000倍・7日前・2回   |         |     |     |        |       |          |    |
| ペイオフME液剤           | 1000~2000倍・7日前・4回   |         |     |     |        |       |          |    |

\*裏面へ続く

※使用農薬については、普及所、営農指導員の指導を受け別紙登録薬剤一覧又は令和7年富良野地区営農推進協議会の病害虫防除手引を参考にして下さい。

北千生氣株式会社  
TEL 0167-44-2255 FAX 0167-44-2436

## 烟住所