

令和8年度 スイートコーン耕作者カード

生産者氏名		TEL		生産者番号			
住所		収穫日				月	日
面積	a	前作名	品種	令和9年希望面積		a	
肥料（基肥・10a・kg）		土改剤・有機質		葉面剤布・他			

北千生氣(株)安心・安全栽培履歴

薬剤名	倍率・使用時期・回数	1回目		2回目		3回目		4回目	
		月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率	月/日	倍率
<殺菌剤>									
トリフィン水和剤	2000～4000倍・7日前・3回								
<殺虫剤>									
モスピランSL液剤	4000倍～6000倍・前日・3回								
オルト水和剤	1000倍・7日前・2回								
アグロスリン乳剤	1000倍～2000倍・7日前・3回								
トレボン乳剤	1000倍・7日前・4回								
ペイオME液剤	2000倍・14日前・2回								
ゲットアクトWDG	3000倍・7日前・3回								
プレバソソフロアブル5	2000倍・前日・3回								
コルト顆粒水和剤	4000倍・前日・3回								
ピレスコ顆粒水和剤	5000倍～10000倍・前日・3回								
アクト顆粒水溶剤	3000倍・7日前・2回								
アファム乳剤	1000～2000倍・3日前・2回								
<除草剤>									
ゲザノコール	作物の2～4葉期140～260mℓ・1回								
モーティブ乳剤	播種後～2葉期200～400mℓ・1回								
デュアルコート	作物の1～2葉期70～100mℓ・1回								
ブルーシアフロアブル	作物の6～7葉期50～75mℓ・45日前・1回								

*裏面へ続く

※使用農薬については、普及所、営農指導員の指導を受け別紙登録薬剤一覧又は令和8年富良野地区営農推進協議会の病害虫防除手引を参考にしてください。

畑住所

4